

## FICHA TÉCNICA

### INSETICIDA TRITOMAX CITROMAX

Classe:.....Inseticida  
Ingrediente Ativo:.....Bifentrina,  
Acetamiprido, Piriproxifen  
Formulação:.....Líquido  
Categoria:.....Empresa Especializada  
Registro no M.S./ANVISA:.....329230137

### COMPOSIÇÃO

Bifentrina:.....10% p/p  
Acetamiprido:.....10% p/p  
Piriproxifen:.....10% p/p  
Inertes:.....70% p/p

### INDICAÇÕES DE USO

O Inseticida Tritomax Citromax é um produto eficaz contra carrapato-estrela (*Amblyomma cajannense*), barata (*Blatella germânica*), aranha (*Loxosceles gaucho*), mosca (*Musca domestica*), mosquitos (*Aedes Aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), pulga (*Ctenocephalides felis*), percevejo de cama (*Cimex lectularius*) e larvas de moscas (*Musca domestica*) e mosquito (*Aedes Aegypti*).

### INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Diluir o Inseticida Tritomax Citromax na concentração de 20 ml do produto em 10 L de água para pulgas e baratas, 25 ml do produto em 10 L de água para carrapato-estrela, mosquitos, moscas, percevejo de cama e larvas de moscas e *Aedes Aegypti* e 100 ml do produto em 10 L de água para aranha marrom. Aplicar 50 ml de calda por m<sup>2</sup> ou 10 litros de calda por 200 m<sup>2</sup> nos esconderijos por pulverização manual ou motorizada a baixa pressão e com bico tipo leque. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou sempre que forem detectadas novas infestações.

## PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Após aplicação, tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.
- Pode ser fatal se ingerido.
- **Tempo de reentrada:** 6 horas após a aplicação.
- **Descarte de embalagem:** Realizar tríplice lavagem das mesmas e descarte observando a Legislação Estadual e Municipal específica.
- Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material e enviados ao programa de reciclagem aprovado e credenciado.
- Após a aplicação devem ser tomadas precauções para evitar que pessoas ou animais tenham contato com a superfície tratada.

### PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.





- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Piretroide,  
Neonicotinoide, éter piridiloxipropílico  
Nome Comum:.....Bifentrina,  
Acetamiprido, Piriproxifen  
Antídoto:.....Anti-histamínicos  
Tratamento:.....Tratamento sintomático  
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 643 5252

FABRICADO POR:  
Citromax Indústria e Comércio LTDA,  
CNPJ: 00.187.467/0001-92  
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul  
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000  
www.citromax.ind.br  
sac@citromax.ind.br  
Fone: (49) 3344-3087

