

FICHA TÉCNICA

INSETICIDA MAXTARION CITROMAX

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Bifentrina
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230141

COMPOSIÇÃO

Bifentrina:.....20% p/p
Inertes:.....80% p/p

INDICAÇÕES DE USO

O Inseticida Maxtarion Citromax é um produto eficaz contra baratas (*Blatella germânica* e *Periplaneta americana*), aranhas (*Nescotides rufipes* e *Loxosceles gaucho*), moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Aedes Aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), pulgas (*Ctenocephalides felis*), ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), lagartas (*Brassolis* sp.), traças (*Lepisma* sp.), barbeiro (*Triatoma infestans*), percevejo de cama (*Cimex lectularius*), carunchos (*Sitophilus zeamais*) e cupins (*Coptotermes gestroi* e *Nasutitermes* sp.).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Diluir o Inseticida Maxtarion Citromax na concentração de 25 ml do produto para 10 L de água para percevejo de cama, 30 ml do produto em 10 L de água para cupins, 45 ml do produto em 10 L de água para aranhas, carunchos, baratas, moscas, mosquitos e *Aedes Aegypti*, 50 ml do produto em 10 L de água para lagartas, 75 ml do produto em 10 L de água para traças, ácaros e barbeiro e 100 ml do produto em 10 L de água para pulgas. Aplicar 50 ml de calda por m² nos esconderijos por pulverização manual ou motorizada a baixa pressão e com bico tipo leque. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou sempre que forem detectadas novas infestações.

Tratamento preventivo contra cupins subterrâneos: Diluir 30 ml do produto em 10 L de água ou 300 mL do produto para 100 L de água. Prepare o local fazendo buracos no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade, com distância de 20 cm um do outro. Aplique 5 L de calda preparada por cada metro linear.

PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.

- Não reutilizar as embalagens vazias.

- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.

- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.

- Após aplicação, tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.

- Pode ser fatal se ingerido.

- **Tempo de reentrada:** 6 horas após a aplicação.

- **Descarte de embalagem:** Realizar tríplice lavagem das mesmas e descarte observando a Legislação Estadual e Municipal específica.

- Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material e enviados ao programa de reciclagem aprovado e credenciado.

- Após a aplicação devem ser tomadas precauções para evitar que pessoas ou animais tenham contato com a superfície tratada.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.





- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Piretroide
Nome Comum:.....Bifentrina
Antídoto:.....Anti-histamínicos
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

FABRICADO POR:
Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087



FT 0141 - 01/07/2024
Elaborado em 27/08/2020
Revisão nº 02 em 01/07/2024